

(1)

Tampereen kesäyliopisto, kevät 2013

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030**1. harjoitus, (la 12.1.2013)****1. Ratkaise yhtälöt**

a) $2x + 2 = 7x + 8$ b) $6(x+2) = 5x + 10$ c) $3x + 1 = 3(x+1)$

$$\begin{array}{l|l}
\text{a)} & \begin{aligned} 2x + 2 &= 7x + 8 \\ \Leftrightarrow 2x - 7x &= 8 - 2 \\ \Leftrightarrow -5x &= 6 \quad | :(-5) \\ \Leftrightarrow x &= -\frac{6}{5} \end{aligned} \\
\hline
\text{b)} & \begin{aligned} 6(x+2) &= 5x + 10 \\ \Leftrightarrow 6x + 12 &= 5x + 10 \\ \Leftrightarrow 6x - 5x &= 10 - 12 \\ \Leftrightarrow x &= -2 \end{aligned}
\end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad 3x + 1 &= 3(x+1) \\ \Leftrightarrow 3x + 1 &= 3x + 3 \\ \Leftrightarrow 3x - 3x &= 3 - 1 \\ 0 &= 2 \quad \checkmark \\ &\text{eikä ratkaisua.} \\ \Rightarrow R_j &= \emptyset \end{aligned}$$

Vastaus:

$$\begin{array}{l}
\text{a)} \quad x = -6/5 \\
\text{b)} \quad x = -2 \\
\text{c)} \quad R_j = \emptyset
\end{array}$$

2. Ratkaise yhtälöt

a) $2x^2 + 3x + 1 = 0$ b) $5x^2 + x = 4x^2 - 2x + 4$ c) $(x+1)(x-3) = (x+1)$

Kasvava $ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad 2x^2 + 3x + 1 &= 0 \quad \begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \\ c = 1 \end{cases} \\
\Leftrightarrow x &= \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1}}{2 \cdot 2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 8}}{4} = \frac{-3 \pm 1}{4}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow x &= -\frac{1}{2} \quad \text{tai} \quad x = -1 \\
\hline
& (x_1 = -\frac{1}{2} \quad \text{ja} \quad x_2 = -1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b) \quad & 5x^2 + x = 4x^2 - 2x + 4 \\
 \Leftrightarrow & 5x^2 - 4x^2 + x + 2x - 4 = 0 \\
 \Leftrightarrow & x^2 + 3x - 4 = 0 \\
 \Leftrightarrow & x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)}}{2 \cdot 1}
 \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a = 1 \\ b = 3 \\ c = -4 \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}
 \Leftrightarrow & x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 16}}{2} = \frac{-3 \pm 5}{2} \\
 \Leftrightarrow & \underline{\underline{x = 1 \text{ tai } x = -4}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 c) \quad & (x+1)(x-3) = (x+1) \\
 \Leftrightarrow & x^2 - 3x + x - 3 = x + 1 \\
 \Leftrightarrow & x^2 - 2x - 3 - x - 1 = 0 \\
 \Leftrightarrow & x^2 - 3x - 4 = 0 \quad a=1, b=-3, c=-4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Leftrightarrow & x = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)}}{2 \cdot 1} = \frac{3 \pm 5}{2} \\
 \Leftrightarrow & \underline{\underline{x = 4 \text{ tai } x = -1}}
 \end{aligned}$$

Vaihtoehdot:

$$\begin{aligned}
 a) \quad & x = -\frac{1}{2} \text{ tai } x = -1 \\
 b) \quad & x = 1 \text{ tai } x = -4 \\
 c) \quad & x = 4 \text{ tai } x = -1
 \end{aligned}$$

3. Ratkaise yhtälöt

$$a) 2^x = 3 \quad b) \ln(x-1) = 100 \quad c) \frac{2x+1}{x-1} = 3$$

$$\begin{aligned}
 a) \quad & 2^x = 3 \quad | \ln(\dots) \\
 \Leftrightarrow & \ln 2^x = \ln 3 \\
 \Leftrightarrow & x \ln 2 = \ln 3 \quad | : \ln 2 \\
 \Leftrightarrow & x = \frac{\ln 3}{\ln 2} \approx \underline{\underline{1,58496}}
 \end{aligned}$$

$$\text{b)} \quad \ln(x-1) = 100 \Leftrightarrow x-1 = e^{100} \Rightarrow x = \underline{\underline{e^{100} + 1}}$$

$$\text{c)} \quad \frac{2x+1}{x-1} = 3 \quad | \cdot (x-1) \quad (\text{huom } x \neq 1)$$

$$\Leftrightarrow 2x+1 = 3(x-1)$$

$$\Leftrightarrow 2x+1 = 3x-3$$

$$\Leftrightarrow 2x-3x = -3-1$$

$$\Leftrightarrow -x = -4$$

$$\Leftrightarrow \underline{\underline{x = 4}} \quad \text{ok}$$

1

2

- Vastaus:
- $x \approx 1,58496$
 - $x = \underline{\underline{e^{100} + 1}}$
 - $x = \underline{\underline{4}}$

4. Ratkaise epäyhtälöt

$$\text{a)} \quad x-1 \leq 3x+1 \quad \text{b)} \quad 3(x+1) \geq 5(x-1)$$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & x-1 \leq 3x+1 \\ & x-3x \leq 1+1 \\ & -2x \leq 2 \quad | :(-2) \\ & \underline{\underline{x \geq -1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & 3(x+1) \geq 5(x-1) \\ & 3x+3 \geq 5x-5 \\ & 3x-5x \geq -5-3 \\ & -2x \geq -8 \quad | :(-2) \\ & \underline{\underline{x \geq 4}} \end{aligned}$$

(4)

5. Yritys myy tammikuussa 256 tuotetta. Yhden tuotteen myyntihinta on 25.20€ ja tuotteen valmistaminen aiheuttaa kustannuksia 18.10€ (per tuote). Myyntitulo on $256 \cdot 25.20e = 6451.20e$, valmistuskustannus on $256 \cdot 18.10e = 4633.60e$. Kate on myyntitulo - valmistuskustannus = $6451.20e - 4633.60e = 1817.60$. Kate on siis 28.17% myynnistä.

Helmikuussa tuotteita myydään 300 kappaletta. Myyntihinta ei kasva, mutta valmistuskustannukset (per tuote) kasvavat 5,0%.

- Laske helmikuun myyntitulo (koko tuotanto).
- Laske helmikuun valmistuskustannukset (koko tuotanto).
- Laske helmikuun kate (euroina).
- Laske helmikuun kate (prosentteina myynnistä).
- Miten monta prosenttia myyntitulo kasvoi?
- Miten monta prosenttia valmistuskustannukset kasvoivat?
- Miten monta prosenttia kate kasvoi?
- Miten monta prosenttiyksikköä kate kasvoi?

	TAMMI	HELSINKI
myyntihinta p	$p_1 = 25.20 \text{ €/kpl}$	$p_2 = p_1 = 25.20 \text{ €/kpl}$
määärä (kpl) q	$q_1 = 256 \text{ kpl/kk}$	$q_2 = 300 \text{ kpl/kk}$
myyntitulo R = q · p	$R_1 = 6451,20 \text{ €/kk}$	$R_2 = q_2 \cdot p_2 =$
valm. kust/koste C	$C_1 = 18,10 \text{ €/kpl}$	$C_2 =$
kok. kust C = q · c	$C_1 = 4633,60 \text{ €/kk}$	$C_2 = q_2 \cdot C_1$
kate K = R - C	$K_1 = 1817,60 \text{ €/kk}$	$K_2 = R_2 - C_2$
katsova % $K_p = \frac{K}{R} \cdot 100\%$	$K_p_1 = 28,17\%$	$K_p_2 = \frac{K_2}{R_2} \cdot 100\% =$

Polyäntöjä $c_2 = (1 + \frac{5}{100}) \cdot c_1 = 19,005 \text{ €/kpl}$

b) $C_2 = q_2 \cdot c_2 = 300 \frac{\text{kpl}}{\text{kk}} \cdot 19,005 \text{ €/kpl} = 5701,50 \text{ €/kk}$

c) $R_2 = q_2 \cdot p_2 = 300 \frac{\text{kpl}}{\text{kk}} \cdot 25,20 \frac{\text{€}}{\text{kpl}} = 7560,00 \text{ €/kk}$

d) $K_2 = R_2 - C_2 = 7560 \frac{\text{€}}{\text{kk}} - 5701,50 \frac{\text{€}}{\text{kk}} = 1858,50 \frac{\text{€}}{\text{kk}}$

e) $K_p_2 = \frac{K_2}{R_2} \cdot 100\% = \frac{1858,50}{7560} \cdot 100\% = 24,58\%$

f) $\frac{(C_2 - C_1)}{C_1} \cdot 100\% = \frac{(5701,5 - 4633,6)}{4633,6} \cdot 100\% = 23,0\%$

g) $\frac{(K_2 - K_1)}{K_1} \cdot 100\% = \frac{(1858,5 - 1817,6)}{1817,6} \cdot 100\% = 2,3\%$

h) $K_p_2 - K_p_1 = 24,58\% - 28,17\% = -3,6\%$

Vastaus

- e) Myyntihinta karvaan 17,2 %
- f) (kokonais) valmistuskustannus karvaan 23 %
- g) Kato karvaan 2,3 %
- h) Katalypparetti pienenee 3,6 prosenttiyksiköllä

6. Yritys tarvitsee raaka-aineena pahvia, joka kerätään kierrätysmateriaalista. Kierrätysmateriaalia voidaan ostaa kolmesta paikasta (A, B, C). Kaikki kierrätysmateriaali pitää vielä itse tarkastaa ja hylätyn materiaalin toimittaminen eteenpäin aiheuttaa edelleen kustannuksia. Seuraavassa taulukossa on esitetty keskimääriäisiä lukuja eri vaihtoehdosta. Laske raaka-aine -pahvin tonnihinta kussakin hankintavaihtoehdossa.

	A	B	C
kierrätysmateriaalin hinta (per tonni)	100.00	125.00	95.00
Hylättävän materiaalin osuus	6.0%	2.0%	10.0%
Tarkastuksen hinta (per kierr.mat.tonni)	10.0€	11.0€	12.0€
Hylätyn materiaalin käsittely (€/tonni)	20.0	15.0	5.0

Ostetun kierrätysmateriaalin määrä x tonnia

Hytävät varaa saadaan

A	B	C
$0,96x$ tn	$0,98x$ tn	$0,90x$ tn

sisään arto

tarkastus

hylätyn leiri Hyl

kustannus ylötunnissa

A	B	C
$100 \frac{\text{€}}{\text{tn}} \cdot x \text{ tn}$	$125 \times \text{€}$	$95 \times \text{€}$
$10 \times \text{€}$	$11 \times \text{€}$	$12 \times \text{€}$
$20 \cdot 0,04 \cdot x \text{ €}$	$15 \cdot 0,02 \cdot x \text{ €}$	$5 \cdot 0,10 \cdot x \text{ €}$

$$110,8 \cdot x \text{ €} \quad 136,3 \cdot x \text{ €} \quad 107,5 \cdot x \text{ €}$$

yhinkelkienku =

Mitä maksisi?
paljonko saatuu?

$$P_A = \frac{110,8 \cdot x \cdot \text{€}}{0,96 \cdot x \cdot \text{tn}} = \underline{\underline{115,42 \text{ €/tn}}}$$


∴ edullisin
vaihtoehto
on A

$$P_B = \frac{136,3 \cdot x \cdot \text{€}}{0,98 \cdot x \cdot \text{tn}} = \underline{\underline{139,08 \text{ €/tn}}}$$

$$P_C = \frac{107,5 \cdot x \cdot \text{€}}{0,90 \cdot x \cdot \text{tn}} = \underline{\underline{119,44 \text{ €/tn}}}$$

7. Piirrä funktion $f(x) = 5 + 2x - 0,1x^2$ kuvaaja. Missä funktio on kasvava ja missä se on vähenevä? (Ohje: Piirrä kuvaaja välille $0 \leq x \leq 20$.)


x	$f(x) = 5 + 2x - 0,1x^2$
0	$5 + 2 \cdot 0 - 0,1 \cdot 0^2 = 5 + 0 - 0 = 5,0$
1	$5 + 2 \cdot 1 - 0,1 \cdot 1^2 = 5 + 2 - 0,1 = 6,9$
2	$5 + 2 \cdot 2 - 0,1 \cdot 2^2 = 5 + 4 - 0,4 = 8,6$
4	$5 + 2 \cdot 4 - 0,1 \cdot 4^2 = 5 + 8 - 1,6 = 11,4$
6	$5 + 2 \cdot 6 - 0,1 \cdot 6^2 = 5 + 12 - 3,6 = 13,4$
8	$5 + 2 \cdot 8 - 0,1 \cdot 8^2 = 5 + 16 - 6,4 = 14,6$
10	$5 + 2 \cdot 10 - 0,1 \cdot 10^2 = 5 + 20 - 10 = 15,0$
12	$5 + 2 \cdot 12 - 0,1 \cdot 12^2 = 5 + 24 - 14,4 = 14,6$
14	$5 + 2 \cdot 14 - 0,1 \cdot 14^2 = 5 + 28 - 19,6 = 13,4$
16	$5 + 2 \cdot 16 - 0,1 \cdot 16^2 = 5 + 32 - 25,6 = 11,4$
18	$5 + 2 \cdot 18 - 0,1 \cdot 18^2 = 5 + 36 - 32,4 = 8,6$
20	$5 + 2 \cdot 20 - 0,1 \cdot 20^2 = 5 + 40 - 40 = 5,0$



8. Piirrä välillä $0 \leq x \leq 5$ kuvaajat funktioille

$$f(x) = x^2 - x, \quad g(x) = 4x - 6$$

x	$f(x) = x^2 - x$	x	$g(x) = 4x - 6$
0.0	$0^2 - 0 = 0$	0.0	$4 \cdot 0 - 6 = -6$
0.5	$0.25 - 0.5 = -0.25$	1.0	
1.0	$1^2 - 1 = 0$	2.0	
2.0	$2^2 - 2 = 2$	3.0	
3.0	$3^2 - 3 = 6$	4.0	
4.0	$4^2 - 4 = 12$	5.0	$4 \cdot 5 - 6 = 14$
5.0	$5^2 - 5 = 20$		



9. Ovatko tehtävän 8 funktiot $f(x)$ ja $g(x)$ kasvavia välillä $0 \leq x \leq 5$?

g on kasvava koko välillä $0 \leq x \leq 5$

f ei ole kasvava koko välillä $0 \leq x \leq 5$
 (f on vähenevä välillä $0 \leq x \leq 0,5$)

(8)

10. Ratkaise

a) $1.05^x = 1.50$ b) $(1.05)^x \geq (1.15)^3$

a) $1.05^x = 1.50 \quad | \ln(\cdot)$
 $\Rightarrow x \ln 1.05 = \ln 1.50$
 $\Rightarrow x = \frac{\ln 1.50}{\ln 1.05} \approx 8.31$

b) $(1.05)^x \geq (1.15)^3 \quad | \ln(x)$ ln on kasvava funktio!
 $\Rightarrow \ln [1.05^x] \geq \ln [1.15^3]$
 $\Rightarrow x \ln 1.05 \geq 3 \ln 1.15$
 $\Rightarrow x \geq \frac{3 \ln 1.15}{\ln 1.05} \approx 8.59$

Vastaus a) $x = 8.31$
 b) $x \geq 8.59$

11. Yritys haluaa lisätä valmistamansa tuotteen myyntiä. Tätä varten yritys joutuu laskemaan tuotteensa myyntihintaa. Markkinointiosasto selvitti kysyntää ja arvelee, että yritys saa myytyä q tuotetta (viikossa), jos tuotteen myyntihinta on $p = 20 - 0.25q$ (euroa). Minkä pitää myyntihinnan olla, jos yritys haluaa, että myynnistä kertyy viikossa vähintään 375 euroa?

$$\begin{aligned} p &= 20 - 0.25q \\ \Rightarrow 0.25q &= 20 - p \\ \Rightarrow q &= 80 - 4p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= q \cdot p = (80 - 4p) \cdot p \\ &= 80p - 4p^2 \end{aligned}$$

∴ Millä p :n arvoilla $R \geq 375$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 80p - 4p^2 &\geq 375 \\ \Rightarrow -4p^2 + 80p - 375 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(p) &= -4p^2 + 80p - 375 \\ \Rightarrow 7.5 &\leq p \leq 12.5 \end{aligned}$$

V: Myyntihinnan tulisi olla vähintään 7,5 € ja enintään 12,5 €

